

El Comité de expertos en el uso de medicamentos de la EMEA ha dado el visto bueno a tres vacunas contra la gripe A (H1N1) y sus fichas técnicas están disponibles (aunque todavía no están comercializadas):

- [FOCETRIA®](#) de Novartis (29 de septiembre)
- [PANDEMRIX®](#) de GlaxoSmithKline (29 de septiembre)
- [CELVAPAN®](#) de Baxter (6 de octubre)

Hasta que se comercialicen, distribuyan y administren a la población (todavía no se conoce fecha exacta), **habrá que estar atentos a las continuas actualizaciones de los datos clínicos de estas vacunas**

ya que se están desarrollando

[ensayos clínicos](#)

que aportarán nuevos datos para “la toma de decisiones oportunas y reflexionadas”.

Como no sabemos cual nos tocará, hemos realizado una tabla comparativa de las tres vacunas con los datos más destacables. En las fichas técnicas podemos encontrar todos los ensayos clínicos realizados “no publicados por la premura de tiempo” que determinan la inmunogenicidad de las vacunas.

Nombre	
Fabricante	FOCETRIA®
Novartis	PANDEMRIX®
GlaxoSmithKline	CELVAPAN®
Baxter	
Composición	Antígenos de superficie
	Virus fraccionados inactivados
	Virus com

Desarrollo

Propagado en huevos embrionados

Propagado en huevos embrionados

Propagado

Adyuvante

MF59C.1

AS03

Sin adyuvante

Dosis equivalente de antígeno (HA)

7,5µg(0,5ml)

3,75µg

7,5µg

Cepa Variante

A/California/7/2009 (H1N1): (X-179A)

A/California/7/2009 (H1N1): (X-179A)

A/California/7/2009 (H1N1): (X-179A)

Ensayos realizados

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Vía administración

Intramuscular

(se debe acondicionar el recinto de administración por si anafilaxia)

Posología

Adultos (18-60 años)

Una dosis

Se debería poner una segunda a los 21 días "puede" ser suficiente

Usar desde

Debe administrarse una segunda a los 21 días

Posología

> 60 años

Una dosis

Se debería poner una segunda a los 21 días

Se debe administrar una segunda a los 21 días

Debe administrarse una segunda a los 21 días

Posología

10 años a 17 años

Una dosis

Se debería poner una segunda a los 21 días

Se debe administrar una segunda a los 21 días

Debe administrarse una segunda a los 21 días

Posología

6 meses a 9 años

Una dosis

Se debería poner una segunda a los 21 días (0,25 ml)

Se debe administrar otra dosis a los 21 días

Debe administrarse una segunda a los 21 días

Posología

< 6 meses

No está actualmente recomendada

Datos clínicos

Datos Clínicos serán actualizados de acuerdo con los datos

PD.- El Grupo de Trabajo de [Pediatría Basada en la Evidencia](#) (GT-PBE) de la Asociación Española de Pediatría ha realizado una espléndida recopilación actualizada a fecha 5 de octubre de 2009 sobre la inmunización frente a la gripe pandémica (capítulo 5) en “[el informe sobre la gripe pandémica en pediatría](#)”.

Fuente:www.hemosleido.es