



PROTOCOLO DE SOLICITUD DE MEROPENEM-VABORBACTAM

DATOS DEL PACIENTE

Apellidos..... Nombre.....

Nº Historia Clínica..... Cama..... Edad.....

CRITERIOS DE UTILIZACION

Tratamiento dirigido en pacientes adultos mayores de 18 años con infecciones muy graves (bacteriemia) producidas por cepas productoras de **carbapenemasas KPC** cuando no exista otra alternativa terapéutica o cuando la toxicidad de la alternativa existente sea inaceptable para el paciente y que sean resistentes a Ceftazidima-Avibactam.

A diferencia de Ceftazidima-Avibactam, no es activo frente a carbapenemasas tipo OXA.

En cualquier caso, la utilización de Meropenem-Vaborbactam debe ser supervisada por el PROA del Hospital.

POSOLOGÍA, PREPARACIÓN Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Dosis habitual: Meropenem-Vaborbactam 2g/2g cada 8h en perfusión extendida de 3h.

Ajuste en IR: CICr 20-39 ml/min*: Meropenem-Vaborbactam 1g/1g cada 8h.

CICr 10-19 ml/min*: Meropenem-Vaborbactam 1g/1g cada 12h

CICr < 10 ml/min*: Meropenem-Vaborbactam 0,5g/0,5g cada 12h.

**Aclaramiento de creatinina estimado utilizando la fórmula de Cockcroft-Gault.*

En todos los casos se administrará en perfusión extendida de 3 horas.

Cada vial se reconstituye con 20 ml de SF 0,9% y se diluye en 250 ml de SF 0,9%. La dilución es estable 4h a T^a ambiente y 22h en frigorífico



REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES

- Trombocitopenia.
- Hipopotasemia e hipoglucemia.
- Hipotensión.
- Cefalea (con menor frecuencia, convulsiones).
- Trastornos gastrointestinales.
- Trastornos hepato biliares: aumento de enzimas hepáticas.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a carbapenémicos.
- Hipersensibilidad grave a cualquier otro tipo de agente antibacteriano beta-lactámico.

ADVERTENCIAS

- En pacientes que reciben ácido valproico, pueden reducirse sus niveles y aumentar el riesgo de convulsiones.
- Meropenem-Vaborbactam contiene 10,9 mmol (250 mg) de sodio por vial.

COSTE

Coste diario del tratamiento: 376,25 €

Fecha:

Firma: