# EPOETINA BETA (NEORECORMON®)

DOSIS:
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

## ¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO?

- Se utiliza para aumentar el número de glóbulos rojos, y así evitar transfusiones de sangre.
- Requiere de 2 a 6 semanas para conseguir un aumento de glóbulos rojos.
- Puede necesitar suplementos de hierro, consulte con su médico.

## ¿CÓMO ADMINISTRAR ESTE MEDICAMENTO?

- Se administra en inyección debajo de la piel (vía subcutánea). La administración deberá realizarse EL MISMO DÍA DE LA SEMANA y aproximadamente a la misma hora.
- Los sitios más adecuados para la inyección son los que se encuentran sombreados en el siguiente dibujo:



- Cambie cada día el lugar de inyección para evitar dolor al pincharse.

ADMINISTRACIÓN

1. Saque la jeringa del frigorífico y espere 10-15 minutos hasta que la jeringa esté a Tª ambiente. Compruebe que el líquido sea claro, incoloro y sin partículas visibles.
2. Lávese cuidadosamente las manos con agua y jabón.
3. Retire la lámina protectora de la aguja y sin sacarla del protector rígido, fíjela sobre la jeringa.
4. Retire la cubierta rígida de la aguja y gire la jeringa hacia arriba para observar si hay burbujas. **Si es así elimínelas** empujando LENTAMENTE el émbolo de la jeringa hasta eliminar el aire.
5. Desinfecte la piel con un algodón con alcohol y pellizque la piel sin apretar.
6. Inserte toda la aguja en la piel manteniéndola pellizcada, de forma que la aguja se mantenga perpendicular o ligeramente inclinada. Si viera sangre en la jeringa, pinche en otro punto.
7. Inyecte el líquido lentamente.
8. Tras la inyección retire la aguja y suelte la piel, desinfecte la piel con algodón limpio con alcohol
9. Ponga la jeringa en un recipiente de desecho adecuado.

## QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS

- Si no ha transcurrido un día, administrarla cuanto antes. Consulte con su médico en caso contrario. Nunca se administre una dosis doble para compensar.

## CONSERVACIÓN

- Conserve las jeringas en nevera entre 2 y 8 ºC. Mantener en embalaje exterior, para proteger de la luz.

## EFECTOS ADVERSOS

**Los efectos de este medicamento pueden ser negativos si no se realiza un seguimiento estricto. Es muy importante acudir a las analíticas solicitadas por su médico.**

**Controle con frecuencia su presión sanguínea. Si se descontrola, avise a su médico.**

- Síntomas de tipo gripal: más frecuentes al principio del tratamiento.
- Aumento de la presión arterial: dolor de cabeza, especialmente súbito y punzante, confusión. Consulte con el médico.
- Reacción alérgica generalizada: sarpullido por todo el cuerpo, dificultad al respirar, pulso rápido o sudoración, suspenda la administración del fármaco y contacte con su médico.
- Alteraciones de la coagulación. El médico debe valorar la continuación del tratamiento.

## ATENCIÓN:

**No use este medicamento si:**

- Es alérgico a epoetina beta o alguno de los excipientes.
- Si no puede recibir tratamiento antitrombótico.

**Consulte con su médico:**

- Si siente hormigueo en manos, piernas o pies.
- Si repentinamente se siente cansado o le falta el aliento.
- Si se marea o pierde el conocimiento.
- Si va a recibir tratamiento antitrombótico.

Revisado: Febrero 2007