

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA (no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Abacavir	Kivexa 600/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Trizivir 300/150/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Triumeq 50/600/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Ziagen 300mg comp	2		Administrar con guante simple
Abiraterona	Zytiga 500mg comp	1		Administrar con guante simple
Acenocumarol	Sintron 1mg comp	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Afatinib	Giotrif 20mg,30mg, 40mg comp	1		Administrar con guante simple
Ambrisentan	Volibris 5mg;10mg comp	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Azatioprina	Imurel 50mg comp	2	SI	Administrar con guante simple
	FM- azatioprina 10mg/ml jarabe	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Axitinib	Inlyta 1mg comp; 5mg	1		Administrar con guante simple
Bosentan	Bosentan 125mg comp	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	FM-Bosentan 6,25mg/ml jarabe	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Cabergolina	Dostinex 0,5mg comp	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Capecitabina	Capecitabina 150mg; 500mg comp	1		Administrar con guante simple
Carbamazepina	Tegretol 200mg comp	2	SI	Administrar con guante simple
	FM-Carbamazepina 40mg/ml jarabe	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Ciclosporina	Sandimum 25mg; 50mg caps	2	SI	Administrar con guante simple
	MNI-Sandimum neoral 100mg/ml solución oral	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
	Sandimum 50mg amp	2	SI	Preparar y administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
	FM-ciclosporina 0,05% colirio	2		Administrar con doble guante y bata ^{2,3}

FM: Fórmula magistral; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluido en guía; PE: Prescripción electrónica. NIOSH: National Institute of safety occupational health;

¹Doble guante o guante específico para MP 1 en caso de alta frecuencia de manipulación; ²Requerido si existe riesgo de salpicadura; ³Requerido si existe riesgo de inhalación;

⁴Bata si existe riesgo de salpicadura.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Clonazepam	Rivotril 2mg comp; Clonazepam 0,5mg comp	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Rivotril 2,5mg/ml gotas orales	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
	Rivotril 1mg/ml amp	3	SI	Si riesgo reproductivo preparar y administrar doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Colchicina	Colchicina 1mg comp; Colchimax 0,5 mg (Colchicina+dicloclomina) comp	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Crizotinib	Xalkori 200mg; 250mg caps	1		Administrar con guante simple
Dabrafenib	Tafinlar 75mg caps	1		Administrar con guante simple
Dasatinib	Sprycel 20mg; 50mg; 70mg comp	1		Administrar con guante simple
Dinoprostona	Propess 10mg comp vag	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata ^{2,3}
Efavirenz	Efavirenz 600mg comp	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Atripla 600/200/245mg comp rec	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Entecavir	Entecavir 0,5mg; 1mg comp	2		Administrar con guante simple
	MNI- Baraclude 0,05mg/ml sol oral	2		Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Erlotinib	Tarceva 25mg; 100mg; 150mg comp	1		Administrar con guante simple
Espironolactona	Aldactone 25mg; 100mg comp	2	SI	Administrar con guante simple
	FM-Espironolactona 10mg/ml	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
	FM-Espironolactona 1mg/ml	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Etopósido	Vepesid 50mg; 100mg caps	1		Administrar con guante simple
	FM-Etopósido 10mg/ml sol oral	1		Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Everólimus	Afinitor 5 mg; 10mg comp	1		Administrar con guante simple
	Certican 0,25mg; 0,5mg; 0,75mg; 1mg comp	1		Administrar con guante simple

FM: Fórmula magistral; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluido en guía; PE: Prescripción electrónica. NIOSH: National Institute of safety occupational health;
¹Doble guante o guante específico para MP 1 en caso de alta frecuencia de manipulación; ²Requerido si existe riesgo de salpicadura; ³Requerido si existe riesgo de inhalación;
⁴Bata si existe riesgo de salpicadura.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Fenitoína	Epanutin 100mg caps	2	SI	Administrar con guante simple
	Fenitoína 250 mg vial	2	SI	Preparar y administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
	MNI-Epanutin 6mg/ml	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Fenoxibenzamida	Dibenzylan 10mg caps	2		Administrar con guante simple
Fingolimod	Gilenya 0,5mg caps	2		Administrar con guante simple
Fluconazol	Diflucan 100mg caps	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Diflucan 1mg/ml susp oral	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
	FM-Fluconazol 2mg/ml colirio	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata
	Fluconazol 2mg/ml vial	3	SI	Si riesgo reproductivo con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Ganciclovir	Cymenvene 500mg vial	2	SI	Administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
	FM-Ganciclovir 2mg/0,1ml intravítrea	2		Administrar con doble guante y bata
Ganirelix	Orgalutran 0,25mg jer prec	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Gefitinib	Iressa 250mg comp	FT		Administrar con guante simple
Gonadotrofina coriónica	Ovitrelle 250mcg pluma prec	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Hidroxycarbamida/ Hidroxiurea	Hydrea 500mg caps	1	SI	Administrar con guante simple
	FM-Hidroxycarbamida 40mg/ml jarabe	1	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Imatinib	Glivec 100mg, 400mg caps	1		Administrar con guante simple
	Imatinib 400mg comp	1		Administrar con guante simple
Ienalidomida	Revlimid 5mg; 10mg; 15mg; 20mg; 25mg caps	2		Administrar con guante simple
Megestrol	Borea 160mg comp	1	SI	Administrar con guante simple
	MNI-Maygace altas dosis 200mg/ml jarabe	1	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}

FM: Fórmula magistral; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluido en guía; PE: Prescripción electrónica. NIOSH: National Institute of safety occupational health;
¹Doble guante o guante específico para MP 1 en caso de alta frecuencia de manipulación; ²Requerido si existe riesgo de salpicadura; ³Requerido si existe riesgo de inhalación;
⁴Bata si existe riesgo de salpicadura.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA (no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Micofenolato de mofetilo	Myfenax 250mg caps; 500mg comp	2		Administrar con guante simple
	Cellcept 1g/5ml susp oral	2		Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Micofenólico, ácido	Myfortic 180mg comp	2		Administrar con guante simple
Misoprostol	Misofar 200mg comp vaginal	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata ^{2,3}
Nevirapina	Viramune 400mg comp	2		Administrar con guante simple
	MNI-Viramune 50 mg/5ml susp oral	2		Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Nilotinib	Tasigna 150mg; 200mg caps	1		Administrar con guante simple
Nintedanib	Ofev 100mg; 150mg caps	FT		Administrar con guante simple
	Varagatef 100mg caps			
Olaparib	Lynparza 50mg	1		Administrar con guante simple
Oxcarbazepina	Trileptal 300mg comp	2	SI	Administrar con guante simple
	MNI-Trileptal 60mg/ml jarabe	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Oxitocina	Syntocinon 10UI amp	3		Administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Paroxetina	Seroxat 20mg comp	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	MNI-Daparox 33,1 mg/ml gotas orales	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Pazopanib	Votrient 400mg comp	1		Administrar con guante simple
Pomalidomida	Imnovid 3mg; 4mg comp	1		Administrar con guante simple
Procarbazona	Natulan 50mg caps	1		Administrar con guante simple
Propiltiouracilo	Propycil 50mg comp	2		Administrar con guante simple
Regorafenib	Stivarga 40mg comp	1		Administrar con guante simple
Ribavirina	Ribavirina 200mg caps	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	MNI-Rebetol 40mg/ml sol oral	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple ^{1,2,3,4}

FM: Fórmula magistral; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluido en guía; PE: Prescripción electrónica. NIOSH: National Institute of safety occupational health;

¹Doble guante o guante específico para MP 1 en caso de alta frecuencia de manipulación; ²Requerido si existe riesgo de salpicadura; ³Requerido si existe riesgo de inhalación;

⁴Bata si existe riesgo de salpicadura.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Sorafenib	Nexavar 200mg caps	1		Administrar con guante simple
Sunitinib	Sutent 12,5mg; 25mg; 50mg caps	1		Administrar con guante simple
Tacrólimus	Adoport 0,5mg; 1mg; 5mg caps	2		Administrar con guante simple
	Advagraf 0,5mg; 3mg; 5mg caps			
	Envarsus 1mg; 4mg			
	Prograff 0,5mg; 1mg; 5mg caps			
	Tacrólimus 0,02% pomada oftálmica y colirio	2		Administrar con doble guante y bata ^{2,3}
	FM-Tacrólimus 0,5mg/ml susp oral	2		Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Talidomida	Thalidomid 50mg caps	2		Administrar con guante simple
Tamoxifeno	Tamoxifeno 10mg comp	1	SI	Administrar con guante simple
Temozolamida	Temodal 5mg; 20mg; 100mg; 140mg; 180mg comp	1		Administrar con guante simple
	FM-Temozolamida 10 mg/ml susp oral	1		Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
Teriflunomida	Auvagio 14mg comp	2		Administrar con guante simple
Tiamazol	Tirodril 5mg comp	2	SI	Administrar con guante simple
Tretinoin	Vesanoid 10mg caps	3		Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
Triptorelina	Decapeptyl 0,1mg; 3,75mg vial+jer; 11,25mg trimestral vial+amp	1		Administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Valganciclovir	Valganciclovir 450mg comp	2	SI	Administrar con guante simple
	MNI-Valcyte 50mg/ml sol oral	2	SI	Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}

FM: Fórmula magistral; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluido en guía; PE: Prescripción electrónica. NIOSH: National Institute of safety occupational health;
¹Doble guante o guante específico para MP 1 en caso de alta frecuencia de manipulación; ²Requerido si existe riesgo de salpicadura; ³Requerido si existe riesgo de inhalación;
⁴Bata si existe riesgo de salpicadura.

MANEJO DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS INCLUIDOS EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
(no incluye medicamentos citostáticos intravenosos)

PRINCIPIO ACTIVO	ESPECIALIDAD	NIOSH	PE	PRECAUCIONES MANIPULACIÓN
Valproico, ácido	Depakine 200mg; 500mg comp	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	Depakine 200mg/ml sol oral	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
	Depakine 400mg vial	3	SI	Si riesgo reproductivo preparar y administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Voriconazol	Vfend 200mg comp	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple
	MNI-Vfend 40mg/ml suspensión oral	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
	Vfend 200mg vial	3	SI	Si riesgo reproductivo administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
	FM-voriconazol 10mg/ml colirio	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata
	FM-voriconazol 100mcg/0,1 ml intravítrea	3		Si riesgo reproductivo administrar con doble guante y bata
Zidovudina	Trizivir 300/150/300mg comp	2		Administrar con guante simple
	Combivir 150/300mg comp			
	Zidovudina 10mg/ml sol oral	2		Administrar con guante simple ^{1,2,3,4}
	Zidovudina 2mg/ml bolsa perfusión	2		Administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular
Zoledrónico, ácido	Zoledrónico, ácido 4mg bolsa perfusión	3	SI	Si riesgo reproductivo preparar y administrar con doble guante, bata, FFP3 y protección ocular

FM: Fórmula magistral; FT: Ficha técnica; MNI: Medicamento no incluido en guía; PE: Prescripción electrónica. NIOSH: National Institute of safety occupational health;

¹Doble guante o guante específico para MP 1 en caso de alta frecuencia de manipulación; ²Requerido si existe riesgo de salpicadura; ³Requerido si existe riesgo de inhalación;

⁴Bata si existe riesgo de salpicadura.