

## PROTOCOLO DE SOLICITUD DE LINEZOLID

### DATOS DEL PACIENTE

Apellidos.....Nombre.....

Nº Historia Clínica..... Hab/Cama..... Edad.....

Patología de base .....

### CRITERIOS DE UTILIZACION

- Infecciones por enterococo Vancomicin-resistente.
- Neumonías con sospecha de SARM y mala respuesta a Vancomicina y/o fracaso renal severo.
- Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos por microorganismos *Gram positivos* con mala respuesta a Vancomicina y/o fracaso renal severo.
- Pacientes con infección por microorganismos *Gram positivos* con mala respuesta a Vancomicina y/o fracaso renal severo.
- Pacientes con algunas de las infecciones anteriores e imposibilidad de canalizar vía venosa.
- Pacientes candidatos a tratamiento ambulatorio y para los que no exista otra alternativa antibiótica.

### DATOS DE LABORATORIO

Valor de creatinina: .....

Hemoglobina: ..... Plaquetas: ..... Recuento leucocitario: .....

### POSOLOGÍA

600 mg/12h durante 10-14 días. Iniciar terapia secuencial cuando esté indicado clínicamente. Los comprimidos tienen biodisponibilidad oral del 100% y pueden tomarse con o sin alimentos.

### DURACION

Duración máxima del tratamiento 28 días.

### CONTRAINDICACIONES

- Tratamiento con IMAO, ISRS, antidepresivos tricíclicos, antagonistas del receptor 5HT<sub>1</sub>, simpaticomiméticos de acción directa o indirecta, vasopresores, fármacos dopaminérgicos, petidina o buspirona.
- Pacientes con hipertensión no controlada, feocromocitoma, síndrome carcinoide, tirotoxicosis, trastorno bipolar, afectaciones psicoafectivas, estado confusional agudo.

### ADVERTENCIAS

- Linezolid IV contiene 13,7g de glucosa y 114 mg de sodio en cada bolsa.
- Se debe advertir a los pacientes que comuniquen síntomas de alteración visual, neuropatía óptica y periférica, especialmente si se prolonga el tratamiento más de 28 días y en indicaciones no aprobadas.
- Linezolid no es activo frente a infecciones causadas por microorganismos *Gram negativos*.

Fecha:

Firma: