

## PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON APREPITANT

### DATOS DEL PACIENTE

Nº historia: \_\_\_\_\_ Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

### CRITERIOS DE USO

Pacientes que vayan a recibir un esquema de quimioterapia con <b>Cisplatino a dosis mayores de 70 mg/m<sup>2</sup></b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (NO ELEGIBLE)
<b>Pacientes que reciben un esquema de quimioterapia con Cisplatino a dosis mayores de 50 mg/m<sup>2</sup> o basado en la combinación Doxorubicina + Ciclofosfamida y no se controlan con la terapia de referencia*</b>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (NO ELEGIBLE)
<b>Pacientes refractarios:</b> valorar su uso en cualquier tipo de quimioterapia si emesis refractaria a la terapia de referencia* (INDICAR ESQUEMA: _____ )	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (NO ELEGIBLE)
<b>* TERAPIA DE REFERENCIA: ONDANSETRÓN + DEXAMETASONA</b>	

### POSOLOGIA

Emend® (Aprepitant) envase con 3 cápsulas (1 cáps de 125 mg y 2 cáps de 80 mg)

**Día 1:** Aprepitant 125 mg vo + Dexametasona 12 mg iv + Ondansetrón 8 mg iv

**Día 2 y 3:** Aprepitant 80 mg vo + Dexametasona 8 mg vo

**Fecha y Firma**

**Dr.**

