



PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CITICOLINA (SOMAZINA®)

DATOS DEL PACIENTE

Apellidos: _____ Nombre: _____

Diagnóstico: _____; NHC: _____; Edad: _____

Peso: _____; Inicio Síntomas: _____; Escala NIHSS _____

REQUISITOS PARA SU EMPLEO

Paciente ≥ 18 años; ausencia de embarazo; **Inicio síntomas ≤ 24 horas; escala NIHSS ≥ 8** (Ver anexo I)

No es necesario T.A.C craneal para iniciar su uso (la hemorragia intracraneal no contraindica su uso)

INDICACION

A.C.V.A Isquémico

DOSIS

2000 mg/24 repartidos en una o dos dosis. Administración I.M. o I.V.

Puede administrarse por vía intramuscular, endovenosa lenta (de 3 a 5 minutos) o en perfusión (10-15 minutos). Compatible con todas las soluciones isotónicas endovenosas. Los viales pueden administrarse vía oral diluidos en agua.

CRITERIOS A CONSIDERAR

- Puede potenciar los efectos de la L-Dopa
- No debe administrarse junto con medicamentos que contengan centrofenoxina o meclofenoxato.
- Produce hipotensión y ligeros trastornos gastrointestinales en administración oral.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

- 42 DÍAS (6 SEMANAS)

Fecha: _____

Dr. _____


Firma: _____

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CITICOLINA (SOMAZINA®)

DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE USO DE CITICOLINA EN EL ACVA ISQUÉMICO

LLEGADA DEL PACIENTE A URGENCIAS (PROTOCOLO)

¿CUMPLE REQUISITOS PARA EMPLEO CITICOLINA?



**PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CITICOLINA (SOMAZINA®)
ESCALA NIHSS. ANEXO I**

1a. Nivel conciencia	0= alerta
	1= responde a mínimos estímulos
	2= No alerta, requiere estímulos repetidos o dolorosos
	3= Sólo respuestas reflejas o falta total de ellas
1b. Nivel conciencia. Preguntas orales: ¿En que mes vivimos? ¿Qué edad tiene?	0= Ambas respuestas correctas
	1= Una respuesta correcta
	2= Ninguna respuesta correcta
1c. Nivel conciencia. Órdenes motoras: Cierre los ojos, abra los ojos. Con el lado no patético cierre y abra la mano	0= Ambas órdenes correctas
	1= Una orden correcta
	2= Ninguna orden correcta
2. Mirada conjugada	0= Normal
	1= Parálisis parcial de la mirada
	2= desviación forzada de la mirada
3 Visual	0= Sin pérdida visual.
	1= Hemianopsia parcial
	2= Hemianopsia completa
	3= Ceguera total
4 Facial	0= Movimiento normal y simétrico
	1= Borramiento surco nasogeniano o mínima asimetría al sonreír
	2= Parálisis casi total de la zona inferior de la hemicara
	3= Parálisis total.
5 y 6 Actividad motora brazo y pierna	
5a Brazo izquierdo 5b Brazo derecho	0= mantiene posición 10 seg
	1= se mantiene, pero cae antes de 10 seg
	2= moviliza con esfuerzo contra gravedad
	3= mueve pero no levanta extremidad
	4= ausencia de movimientos
6ª Pierna izquierda 6b Pierna derecha	Mismos ítems anterior
7 Dismetría	0= ausente
	1= presente en una extremidad
	2= Presente en dos extremidades
8 Sensibilidad	0= Normal
	1= Leve o moderada (el paciente nota que le toca)
	2= Grave o total
9 Lenguaje	0= Normal
	1= Afasia leve o moderada
	2= Afasia grave (Imposibilidad de entenderse con interlocutor)
	3= Mudo, con comprensión nula
10 Disartria	0= Normal
	1= Leve-moderada
	2= Grave
	0= sin alteraciones
	1= inatención o extinción en una de las modalidades, visual táctil, espacial o corporal.



PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CITICOLINA (SOMAZINA®)

	2= hemi-inatención o negligencia grave o a más de una modalidad.
--	------------------------------------------------------------------

PUNTUACIÓN TOTAL-----

PROTOCOLO CITICOLINA: SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE

A las 12 semanas de inicio del tratamiento se cita al paciente en consulta. Realizar escala de Rankin modificada (Anexo II) e índice de Barthel (Anexo III) y anotar resultados.

DATOS DEL PACIENTE

Apellidos: _____ Nombre: _____

Diagnóstico: _____; NHC: _____;

Edad: _____ Peso: _____; Inicio Síntomas: _____; Escala NIHSS

	FECHA:	ESCALA NIHSS	ESCALA RANKIN	INDICE BARTHEL
DÍA 1	_____	_____	_____	_____
SEMANA 12	_____	_____	_____	_____

ANEXO II ESCALA DE RANKIN MODIFICADA

0.	Asintomático	Capaz de realizar su trabajo y actividad habituales. Incapaz de realizar todas sus actividades previas, capaz de realizar sus necesidades personales sin ayuda. Requiere alguna ayuda, capaz de caminar sin
1.	Incapacidad no significativa pese a la existencia de síntomas	
2.	Incapacidad ligera	
3.	Incapacidad moderada	

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CITICOLINA (SOMAZINA®)

4.	Incapacidad moderadamente grave	ayuda de otra persona.
5.	Incapacidad grave	Incapaz de caminar sin ayuda, incapaz de atender sus necesidades sin ayuda. Limitado a cama, incontinente, requiere cuidados de enfermería y atención constante.
6.	Muerte	

ANEXO III. INDICE DE BARTHEL

Alimentación	-Dependiente	0
	-Necesita alguna ayuda	5
	-independiente	10
Baño	-Necesita ayuda	0
	-Independiente	5
Aseo personal	-Necesita ayuda	0
	-Independiente	5
Vestirse y desvestirse	-Dependiente	0
	-Necesita ayuda parcial	5
	-Independiente	10
Control anal	-Incontinente	0
	-Incontinencia ocasional	5
	-Continente	10
Control vesical	-Incontinente	0
	-Incontinencia ocasional	5
	-Continente	10
Uso del cuarto de baño	-Dependiente	0
	-Necesita alguna ayuda	5
	-Independiente	10
Traslado cama-silla	-Imposible	0
	-Ayuda importante	5
	-Ayuda mínima	10
	-Independiente	15
Paseo	-Imposible	0
	-Silla de ruedas	5
	-Con ayuda	10
	-Independiente	15



COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA CENTRO
Servicio de Farmacia



PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE CITICOLINA (SOMAZINA®)