

Alerta FDA: Interacción de clopidogrel y omeprazol

La FDA notificó a los profesionales sanitarios de nueva información sobre seguridad relativa a la interacción entre clopidogrel (Plavix®) y omeprazol (Prilosec / Prilosec OTC). Nuevos datos muestran que cuando se toman juntos omeprazol y clopidogrel se reduce la eficacia de clopidogrel. Los pacientes en riesgo de ataques cardíacos o derrames cerebrales, que usan clopidogrel para prevenir los coágulos de sangre no obtendrá el efecto completo de este medicamento si también están tomando omeprazol. Separar la dosis de clopidogrel y omeprazol en el tiempo no reducirá la interacción de estos medicamentos.

Otros fármacos que se espera que tengan un efecto similar, y debe evitarse en combinación con clopidogrel incluyen: cimetidina, fluconazol, ketoconazol, voriconazol, etravirina, felbamato, fluoxetina, fluvoxamina, y ticlopidina.

Para ampliar información pinchar aquí. <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PublicHealthAdvisories/ucm190825.htm>

Proporcionan recomendaciones para los profesionales. <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/DrugSafetyInformationforHealthcareProfessionals/ucm190787.htm>

Seguimiento de seguridad desde enero de 2009. <http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/DrugSafetyInformationforHealthcareProfessionals/ucm190784.htm>