

Para prevenir errores en la preparación y administración de Olimel/PeriOlimel y un posible daño a los pacientes, Baxter S.L., de acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) han emitido un comunicado de seguridad para profesionales sanitarios.

## **Resumen**

- Se han notificado errores durante el uso de Olimel/PeriOlimel relacionados con la falta de “activación” (mezclado) o a una “activación” incompleta de los compartimentos de la bolsa, u otros tipos de errores de medicación, tales como velocidad de infusión excesiva o vía de administración incorrecta.
- Se DEBEN seguir cuidadosamente las instrucciones para la preparación y la administración de Olimel/PeriOlimel tal como se describen en la información del producto (ficha técnica y prospecto), para prevenir que se produzca una activación incompleta de la bolsa antes de la administración, u otros errores de medicación.
- Todas las formulaciones de Olimel deben administrarse solo por vía intravenosa central. Únicamente PeriOlimel N4E puede ser administrada también por vía intravenosa periférica debido a su osmolaridad (760 mOsm/l).
- El póster adjunto es una guía recordatoria para los profesionales sanitarios e ilustra el modo correcto de usar Olimel/PeriOlimel con objeto de evitar estos errores de medicación (Anexo 1).

Para ampliar información pinchar [aquí](#) (noviembre 2014)