

Rapiscan Pharma Solutions, de acuerdo con la EMA y la AEMPS ha comunicado información de seguridad importante actualizada relativa a Rapiscan (regadenosón).

**Resumen:**

**Accidente cerebrovascular**

- Se han notificado casos de accidentes cerebrovasculares, algunos de los cuales tuvieron lugar tras presentar los pacientes aumentos clínicamente significativos en la presión arterial, hipotensión severa o agravamiento de una fibrilación auricular preexistente, tras la administración de regadenosón.
- Se debe considerar retrasar la administración de regadenosón en pacientes con hipertensión arterial no controlada.
- Se debe tener precaución cuando se decida administrar regadenosón a pacientes con antecedentes de fibrilación auricular, o a aquellos con riesgo de presentar hipotensión grave.
- No administre regadenosón a pacientes con hipotensión arterial severa.

**Prolongación de las convulsiones inducidas por regadenosón tras la administración de aminofilina**

- Se han notificado casos de prolongación de las convulsiones inducidas por regadenosón tras la administración de aminofilina.
- No se recomienda el uso de aminofilina para hacer cesar las convulsiones inducidas por regadenosón.
- Tenga precaución al considerar la administración de regadenosón a pacientes con antecedentes de convulsiones o factores de riesgo para las mismas, por ejemplo administración concomitante de medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo.

Para ampliar información pinchar [aquí](#) (Fuente AEMPS diciembre 2014)